

# Characteristics of Conversation in Patients with Right Hemisphere Damage

Hye Yeong Jeong<sup>a</sup>, Yeo Jin Kim<sup>b</sup>, Ji Hye Yoon<sup>c</sup>, Jieun Choi<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Department of Speech Pathology, Graduate School of Health Sciences, Hallym University, Chuncheon, Korea

<sup>b</sup>Department of Neurology, Chuncheon Sacred Heart Hospital, Chuncheon, Korea

<sup>c</sup>Division of Speech Pathology and Audiology, Hallym University, Chuncheon, Korea

<sup>d</sup>Department of Speech-Language Pathology and Audiology, Graduate School of Hallym University, Chuncheon, Korea

<https://doi.org/10.12963/csd.19597>

Commun Sci Disord 2019;24(2):432-446

## Before

본 연구의 IRB (한림대학교 춘천성심병원 생명윤리위원회 2018-03-019) 조항에 근거하여 전문의가 모니터링하는 상황에서 환자의 상태가 불안정하지 않은 대상자만 포함시켰다.

## After

본 연구의 IRB (한림대학교 춘천성심병원 생명윤리위원회 2018-03-029) 조항에 근거하여 전문의가 모니터링하는 상황에서 환자의 상태가 불안정하지 않은 대상자만 포함시켰다.